



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Ропадиара для повышения продуктивности и сохранности
сельскохозяйственных животных, в том числе птицы

(организация-производитель компания «Ropapharm International B.V.»/«Ропафарм
Интернэшил Б.В.», Нидерланды)

I. Общие сведения

1. Ропадиар (Ropadiar) – добавка кормовая для повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

2. Добавка в качестве действующего вещества содержит натуральное масло орегано 5-10% (активные компоненты – карвакрол 69,1%, тимол 2,8%) и вспомогательные компоненты: эмульгатор Е484 35-40 %, пропиленгликоль 20%, вода до 100%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду представляет собой раствор светло-желтого цвета с запахом душицы обыкновенной (орегано).

4. Ропадиар выпускают расфасованным в канистры по 0,25; 1,5; 5 и 10 л.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-изготовителя, ее адреса и товарного знака, наименования и назначения добавки, гарантированных показателей, способа применения, срока и условий хранения, даты изготовления, объема в единице фасовки, номера партии, регистрационного номера, информации о подтверждении соответствия и надписи «Для животных». Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытом, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и хорошо вентилируемом месте при температуре от 0 °C до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 70%.

Срок хранения: 24 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Запрещается использовать Ропадиар по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Натуральное масло орегано, входящее в состав Ропадиара, усиливает перистальтику и тонус кишечника, повышает секрецию желудочного сока. Активные компоненты (карвакрол и тимол) обладают противовоспалительными свойствами, и препятствуют развитию патогенной микрофлоры. Запах орегано улучшает аромат кормов, что способствует лучшей поедаемости его животными. Применение Ропадиара с кормом увеличивает сохранность и продуктивность сельскохозяйственных животных.

III. Порядок применения

6. Ропадиар применяют для повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

7. Добавку вводят в корма в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания, в воду для поения – вручную или автодозатором.

Рекомендуемые нормы ввода добавки в корм составляют:

Свиньи - 100-250 мл на 1000 л воды для поения

Телята - 250-400 мл на тонну корма

Птица

Цыплята – бройлеры

100-250 мл на 1000 л воды

Несушки

75-200 мл на 1000 л воды

Индейки

100-200 мл на 1000 л воды

8. Ропадиар совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

9. Побочных явлений и осложнений при применении добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний к применению не установлено.

10. Продукцию свиноводства и птицеводства при применении Ропадиара можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с Ропадиаром необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

12. Добавку следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «Fontanka B.V.» (Нидерланды) совместно с организацией-производителем «Ropapharm International B.V.» (Нидерланды).

Адрес организации-производителя: «Ropapharm International B.V.» Kleine Tocht 13 NL – 1507 CB Zaandam (Нидерланды).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ- 2-13.16/04893